

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
	ペリナNa用100単位/mLシリンジ 10mL(ベミック)	1筒		
	ワンショット：1日1回			
	リザーバーフラッシュ用			
	(不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●	
	デキサート注 3.3mg/1m l	6.6m g		
	ポララミン注 5mg/1m l	1A		
	アロカリス注 235mg/10m L	1瓶		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50m L	1袋		
	点滴注射：1日1回			
	30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	アービタックス注	400m g/m ²		
	(初回のみ400mg/m ²)			
	生理食塩液注【生食】 500m l	500m L		
	点滴注射：1日1回			
	インラインフィルターを使用			
	初回：120分			
注射 4	点滴注射（リザーバーより）		●	
	生食注（生理食塩液）100m l（PG）	1瓶		
	点滴注射：1日1回			
	15分で			
注射 5	点滴注射（リザーバーより）		●	
	レボホリナート注	200m g/m ²		
	(200mg/m ²)			
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L		
	点滴注射：1日1回			
	120分で			
注射 6	点滴注射(リザーバーより)		●	
	カンプト注	150m g/m ²		
	(150-180mg/m ²)			
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L		
	点滴注射：1日1回			
	レボホリナートと同時に側管から投与			
	90分で			
注射 7	点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注	400m g/m ²		
	(400mg/m ²)			
	生理食塩液PL 50m l	50m L		
	点滴注射：1日1回			
	レボホリナート終了後全開			
	4分で			
注射 8	点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50m l	1瓶		
	点滴注射：1日1回			
	フラッシュ用			
注射 9	点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注	2400m g/m ²		
	(2400mg/m ²)			
	生食注（生理食塩液）100m l（PG）	1瓶		
	(全量140m lに調製)			
	点滴注射：1日1回			
	type_T（青色タイプで持ち帰り）			
	46時間で			
注射 10	点滴注射（リザーバーより）			●
	デキサート注 3.3mg/1m l	6.6m g		
	ポララミン注 5mg/1m l	1A		
	生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100m L		
	点滴注射：1日1回			
	30分で			
注射 11	点滴注射			●
	アービタックス注	250m g/m ²		
	(250mg/m ²)			
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L		
	点滴注射：1日1回			
	インラインフィルターを使用			
	60分で			
注射 12	点滴注射（リザーバーより）			●
	生食注（生理食塩液）100m l（PG）	1瓶		
	点滴注射：1日1回			
	15分で			