

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴側管注		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 (プライミング用)		
注射 3	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg	
	アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で		
注射 4	点滴側管注		●
	トラスツズマブ B S 注 (6mg/kg)	6mg / kg	
	注射用水 20m L (トラスツズマブ溶解用)	2A	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 2回目以降30分可。		
注射 5	点滴側管注		●
	マンニトール S 注 300m L / 袋	300m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 6	点滴側管注		●
	シスプラチン注 (80mg/m <sup>2</sup> )	80mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射 7	点滴注射		●
	ソルデム 3 A 注 500m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 2時間で		
注射 8	点滴注射		●
	ヴィーン 3 G 注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 9	点滴注射		●
	ヴィーン 3 G 注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 10	点滴側管注		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 (フラッシュ用)		
内服			
	カペシタピン	2000mg / m <sup>2</sup> 分2 食後	day(1)~(14)服用