

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付 1筒 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック) 1筒 ワンショット：1日1回 リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)		●	●
注射	2	点滴注射 (リザーバーより) デキサート注 3.3mg/1ml 6.6g ポララミン注 5mg/1ml 1A アロカリス注 235mg/10mL 1瓶 アロキシン注バッグ 0.75mg/50mL 1袋 点滴注射：1日1回 30分で		●	
注射	3	点滴注射(リザーバーより) アービタックス注 250mg/m ² (250mg/m ²) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 250mL 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で		●	
注射	4	点滴注射 (リザーバーより) 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 1瓶 点滴注射：1日1回 15分で		●	
注射	5	点滴注射 (リザーバーより) レボホリナート注 200mg/m ² (200mg/m ²) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 250mL 点滴注射：1日1回 120分で		●	
注射	6	点滴注射(リザーバーより) エルブラット注 85mg/m ² (85mg/m ²) 5%ブドウ糖注 250ml 250mL 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で		●	
注射	7	点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 400mg/m ² (400mg/m ²) 生理食塩液PL 50ml 50mL 点滴注射：1日1回 4分で		●	
注射	8	点滴注射 生理食塩液PL 50ml 1瓶 点滴注射：1日1回 フラッシュ用		●	
注射	9	点滴注射(リザーバーより) 5-FU注 2400mg/m ² (2400mg/m ²) 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 1瓶 (全量140mlに調製) 点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で		●	
注射	10	点滴注射 (リザーバーより) デキサート注 3.3mg/1ml 6.6g ポララミン注 5mg/1ml 1A 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 100mL 点滴注射：1日1回 30分で			●
注射	11	点滴注射(リザーバーより) アービタックス注 250mg/m ² (250mg/m ²) 生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) 250mL 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			●
注射	12	点滴注射 (リザーバーより) 生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) 1瓶 点滴注射：1日1回 15分で			●