

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴側管注		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 (プライミング用)		
注射 3	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	9.9mg	
	アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で		
注射 4	点滴側管注		●
	トラスツズマブBS注	8mg / kg	
	(初回のみ8mg/kg)		
	注射用水 20m L	2A	
	(トラスツズマブ溶解用)		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 初回：90分		
注射 5	点滴側管注		●
	マンニトールS注 300m L / 袋	300m L	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 6	点滴側管注		●
	シスプラチン注	80mg / m ²	
	(80mg/m ²)		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250m L	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射 7	点滴注射		●
	ソルデム3A注 500m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 2時間で		
注射 8	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 2時間で		
注射 9	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500m L	500m L	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 10	点滴側管注		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 (フラッシュ用)		
内服			
	カペシタピン	2000mg / m ² 分2 食後	day(1)~(14)服用