

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●
		生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射 (リザーバーより)		●	
		デキサート注 3.3mg/1ml	6.6g		
		ポララミン注 5mg/1ml	1A		
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
		アロキシン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	
		アービタックス注 (初回のみ400mg/m ²)	400mg/m ²		
		生理食塩液注【生食】 500ml	500mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 初回：120分			
注射	4	点滴注射 (リザーバーより)		●	
		生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 15分で			
注射	5	点滴注射 (リザーバーより)		●	
		レボホリナート注 (200mg/m ²)	200mg/m ²		
		生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 120分で			
注射	6	点滴注射(リザーバーより)		●	
		エルブラット注 (85mg/m ²)	85mg/m ²		
		5%ブドウ糖注 250ml	250mL		
		点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で			
注射	7	点滴注射(リザーバーより)		●	
		5-FU注 (400mg/m ²)	400mg/m ²		
		生理食塩液PL 50ml	50mL		
		点滴注射：1日1回 4分で			
注射	8	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50ml	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	9	点滴注射(リザーバーより)		●	
		5-FU注 (2400mg/m ²)	2400mg/m ²		
		生食注 (生理食塩液) 100ml (PG) (全量140mlに調製)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で			
注射	10	点滴注射 (リザーバーより)			●
		デキサート注 3.3mg/1ml	6.6g		
		ポララミン注 5mg/1ml	1A		
		生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	11	点滴注射			●
		アービタックス注 (250mg/m ²)	250mg/m ²		
		生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射	12	点滴注射 (リザーバーより)			●
		生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	1瓶		
		点滴注射：1日1回 15分で			