

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより) 生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付 へパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (へミロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3mg / 1m l アロカリス注 235mg / 10m L アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L 点滴注射：1日1回 30分で	3.3mg 1瓶 1袋	●
注射 3	点滴側管注 アクプラ注 (90mg/m ²) 生理食塩液注 【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 2時間で	90mg/m ² 500m L	●
注射 4	点滴注射 生理食塩液注 【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 アクプラ終了後①。 60分で	500m L	●
注射 5	点滴注射 生理食塩液注 【生食】 500m l 点滴注射：1日1回 アクプラ終了後②。 60分で	500m L	●
注射 6	点滴注射 生理食塩液 P L 50m l 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 7	持続点滴 5-FU注 (4000mg/m ²) 生食注 (生理食塩液) 100m l (P G) (全量185mLに調製) 持続点滴：1日1回 インフューザー-LV2(黄色)使用 96時間で	4000mg/m ² 1瓶	●