

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	リザーバーフラッシュ用 （不要の場合は削除）		
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	3.3mg	
	アロカリス注 235 mg / 10 mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分		
注射 3	点滴注射（リザーバーより）		●
	生食注（生理食塩液）100 mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 オニバイド投与前後フラッシュ用		
注射 4	点滴注射（リザーバーより）		●
	オニバイド注 （70mg/m ² ） （UGT1A1変異：50mg/m ² ）	70mg/m ²	
	5%ブドウ糖注 500 mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 ★遮光で払い出し★ 90分		
注射 5	点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注 （200mg/m ² ）	200mg/m ²	
	生理食塩液注 250 mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 120分		
注射 6	点滴注射（リザーバーより）		●
	5-FU注 （2400mg/m ² ）	2400mg/m ²	
	生食注（生理食塩液）100 mL（PG） （全量140mLに調製）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で		