

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン) ワンショット：1日1回 リザーバーフラッシュ用 （不要の場合は削除）		●
注射 2	点滴注射（リザーバーより） デキサート注 3.3mg/1mL アロカリス注 235mg/10mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	3.3mg 1瓶 1袋	●
注射 3	点滴注射（リザーバーより） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 アロカリスフラッシュ用	1瓶	●
注射 4	点滴注射（リザーバーより） レボホリナート注 （200mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 120分で	200mg/m ² 250mL	●
注射 5	点滴注射（リザーバーより） エルプラット注 （85mg/m ² ） 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で	85mg/m ² 250mL	●
注射 6	点滴注射（リザーバーより） 5-FU注 （400mg/m ² ） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 4分で	400mg/m ² 50mL	●
注射 7	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射 8	点滴注射（リザーバーより） 5-FU注 （2400mg/m ² ） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） （全量140mLに調製） 点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で	2400mg/m ² 1瓶	●