

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(22)	day(29)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒				
	ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパミロック)	1筒				
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)					
注射 2	点滴注射		●			
	生食注（生理食塩液）100m l（PG）	1瓶				
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キイトルーダ）					
注射 3	点滴注射		●			
	キイトルーダ注 (400mg/body)	400mg				
	生食注（生理食塩液）100m l（PG）	100m L				
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30分で					
注射 4	点滴注射		●	●	●	●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg				
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 5	点滴注射		●	●	●	●
	ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg / m ²				
	5%ブドウ糖注 100m l	100m L				
	点滴注射：1日1回 30分で					
注射 6	点滴注射		●	●	●	●
	シスプラチン注 (25mg/m ²)	25mg / m ²				
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L				
	点滴注射：1日1回 60分で					
注射 7	点滴注射		●	●	●	●
	生理食塩液 PL 50m l	1瓶				
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で					