

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1ml	9.9g		
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
	ポラミン注 5mg/1ml	1A		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	【要時】ピロイ注 (400mg/m <sup>2</sup> )	400mg/m <sup>2</sup>		
	注射用蒸留水 100m l (PG) (DW 5.0ml/Vで溶解)	1瓶		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ) (2mg/mLになるように調製)	250mL		
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) (ピロイの希釈に使用)	1瓶		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 最初の30分は、( ) mL/hで投与。 以降、( ) mL/hで投与。			
注射 4	点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50m l	1瓶		
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回			
注射 5	点滴注射（リザーバーより）			●
	デキサート注 3.3mg/1ml	6.6g		
	生理食塩液PL 50m l	1瓶		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 6	点滴注射（リザーバーより）			●
	レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> )	200mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 120分で			
注射 7	点滴注射(リザーバーより)			●
	エルプラット注 (85mg/m <sup>2</sup> )	85mg/m <sup>2</sup>		
	5%ブドウ糖注 250m l	250mL		
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で			
注射 8	点滴注射(リザーバーより)			●
	5-FU注 (400mg/m <sup>2</sup> )	400mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液PL 50m l	50mL		
	点滴注射：1日1回 4分で			
注射 9	点滴注射			●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用。			
注射 10	点滴注射(リザーバーより)			●
	5-FU注 (2400mg/m <sup>2</sup> )	2400mg/m <sup>2</sup>		
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) (全量140m lに調製)	1瓶		
	点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で			