

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20m l ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合削除)		
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	9.9mg	
	アロカリス注 235mg / 10mL	1瓶	
	ボラミン注 5mg / 1ml	1A	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射(リザーバーより)		●
	ピロイ注 (400mg/m <sup>2</sup> )	400mg / m <sup>2</sup>	
	注射用蒸留水 1000ml (PG) (DW 5.0ml/Vで溶解)	1瓶	
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ) (2mg/mLになるように調製)	250mL	
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG) (ピロイの希釈に使用)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 2時間かけて		
注射 4	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶	
	フラッシュ用 点滴注射：1日1回		
注射 5	点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> )	200mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL	
	点滴注射：1日1回 120分で		
注射 6	点滴注射(リザーバーより)		●
	エルプラット注 (85mg/m <sup>2</sup> )	85mg / m <sup>2</sup>	
	5%ブドウ糖注 250ml	250mL	
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 120分で		
注射 7	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (400mg/m <sup>2</sup> )	400mg / m <sup>2</sup>	
	生理食塩液 PL 50ml	50mL	
	点滴注射：1日1回 4分で		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用。		
注射 9	点滴注射(リザーバーより)		●
	5-FU注 (2400mg/m <sup>2</sup> )	2400mg / m <sup>2</sup>	
	生食注(生理食塩液) 100ml (PG) (全量140mlに調製)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で		