

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	<p>静脈内注射</p> <p>生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付</p> <p>ヘリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ヘリンNa)</p> <p>ワンショット：1日1回</p> <p>(不要の場合は削除)</p>	1筒 1筒	●
注射 2	<p>持続点滴</p> <p>ソルデム3A注 500mL</p> <p>★ 20mL メイロン84注</p> <p>持続点滴：1日1回</p> <p>メイン</p> <p>360分で</p>	500mL 1A	●
注射 3	<p>点滴注射</p> <p>ボララミン注 5mg/1mL</p> <p>ハイドロコートン注 100mg/2mL</p> <p>生食注(生理食塩液) 100mL (PG)</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>30分で</p>	1A 100mg 100mL	●
注射 4	<p>点滴注射</p> <p>リツキシマブBS注</p> <p>(375mg/m²)</p> <p>生理食塩液注【生食】 500mL</p> <p>(1mg/mLになるように調製)</p> <p>生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)</p> <p>(リツキシマブの希釈に使用)</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ</p> <p>400mL/hまで。2回目以降に100mL/hで開始。30</p> <p>分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。</p> <p>3-4h。2回目以降2-3h。</p>	375mg/m ² 500mL 1袋	●
注射 5	<p>点滴注射</p> <p>水溶性プレドニン注</p> <p>(60mg/m²・Max100mg/B)</p> <p>アロキシ注バッグ 0.75g/50mL</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>30分で</p>	60mg/m ² 1袋	●
注射 6	<p>点滴注射</p> <p>ポライビー注</p> <p>(1.8mg/kg)</p> <p>注射用水 20mL</p> <p>(ポライビー溶解用)</p> <p>5%ブドウ糖注 100mL</p> <p>インラインフィルター使用</p> <p>初回投与時忍容性良ければ、2回目以降30分可</p> <p>点滴注射：1日1回</p>	1.8mg/kg 1A 100mL	●
注射 7	<p>点滴注射</p> <p>生理食塩液PL 50mL</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>経過観察用</p> <p>15分かけて</p>	1瓶	●
注射 8	<p>点滴注射</p> <p>ドキシルピシン注</p> <p>(50mg/m²)</p> <p>生食注(生理食塩液) 100mL (PG)</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>30分で</p>	50mg/m ² 100mL	●
注射 9	<p>点滴注射</p> <p>エンドキサン注</p> <p>(750mg/m²)</p> <p>生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>90分で</p>	750mg/m ² 250mL	●
注射 10	<p>点滴注射</p> <p>生理食塩液PL 50mL</p> <p>点滴注射：1日1回</p> <p>フラッシュ用</p>	1瓶	●
内服	<p>プレドニゾン</p>	100mg/日 分1-2食後	day(2)~(5)服用