

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)
注射 1	静脈内注射		●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミン)	1筒		
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg		
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
	ポララミン注 5mg/1mL	1A		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射		●	
	【要時】ピロイ注 (600mg/m ²)	600mg/m ²		
	注射用蒸留水 100mL (PG) (DW 5.0ml/Vで溶解)	1瓶		
	生理食塩液注【生食】 500mL (2mg/mLになるように調製)	500mL		
	生理食塩液PL 50mL (ピロイの希釈に使用)	1瓶		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 最初の30分は、() mL/hで投与。 以降、() mL/hで投与。			
注射 4	点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射 5	点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 6	点滴注射			●
	エルプラット注 (130mg/m ²)	130mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL		
	点滴注射：1日1回 120分で			
注射 7	点滴注射			●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
内服				
	カペシタビン	2000mg/m ² 分2 食後		day(1)~(14)服用