

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mLロック付 ペナリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ペナロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で	3.3mg 100mL	●	●
注射 3	点滴注射 パドセブ注 （1.25mg/kg、最大125mg/B） 注射用水 20mL （パドセブ溶解用） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分以上かけて	1.25mg/kg 1A 50mL	●	
注射 4	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 時間確保用（初回30分、忍容性有れば2回目以降15分）	1瓶	●	
注射 5	点滴注射 キイトルーダ注 （200mg/B） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で	200mg 100mL	●	
注射 6	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射 7	点滴注射 パドセブ注 （1.25mg/kg、最大125mg/B） 注射用水 20mL （パドセブ溶解用） 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で	1.25mg/kg 1A 50mL		●
注射 8	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●