

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射 1	静脈内注射 (リザーバーより)		●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒		
	ペリナNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ペリナック)	1筒		
	ワンショット：1日1回			
	リザーバーフラッシュ用 (不要の場合は削除)			
注射 2	点滴注射 (リザーバーより)		●	
	デキサート注 3.3mg/1m l	6.6mg		
	ポララミン注 5mg/1m l	1A		
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 3	点滴注射(リザーバーより)		●	
	アービタックス注 (250mg/m <sup>2</sup> )	250mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射 4	点滴注射 (リザーバーより)		●	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶		
	点滴注射：1日1回 15分で			
注射 5	点滴注射 (リザーバーより)		●	
	レボホリナート注 (200mg/m <sup>2</sup> )	200mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 120分で			
注射 6	点滴注射(リザーバーより)		●	
	イリノテカン注 (150-180mg/m <sup>2</sup> )	150mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 90分で			
注射 7	点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注 (400mg/m <sup>2</sup> )	400mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液PL 50m l	50mL		
	点滴注射：1日1回 レボホリナート終了後全開 4分で			
注射 8	点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50m l	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射 9	点滴注射(リザーバーより)		●	
	5-FU注 (2400mg/m <sup>2</sup> )	2400mg/m <sup>2</sup>		
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG) (全量140m lに調製)	1瓶		
	点滴注射：1日1回 type_T (青色タイプで持ち帰り) 46時間で			
注射 10	点滴注射 (リザーバーより)			●
	デキサート注 3.3mg/1m l	6.6mg		
	ポララミン注 5mg/1m l	1A		
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射 11	点滴注射(リザーバーより)			●
	アービタックス注 (250mg/m <sup>2</sup> )	250mg/m <sup>2</sup>		
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL		
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で			
注射 12	点滴注射 (リザーバーより)			●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶		
	点滴注射：1日1回 15分で			