

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ペリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ペミロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒 1筒	●
注射 2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロカリス注 235mg/10mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	3.3mg 1瓶 1袋	●
注射 3	点滴注射 アバスチン注 （7.5mg/kg） 生食注（生理食塩液） 50mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 30分で	7.5mg/kg 50mL	●
注射 4	点滴注射 イリノテカン注 （200mg/m <sup>2</sup> ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 90分で	200mg/m <sup>2</sup> 250mL	●
注射 5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
内服	カペシタビン	1600mg/m <sup>2</sup> 分2 食後	day(1)～(14)服用