

| 分類 No. | 薬剤/手技  | 投与量                   | day(1) |
|--------|--|-----------------------|--------|
| 注射     | 1 静脈内注射（リザーバーより）                                     |                       | ●      |
|        | 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付                                | 1筒                    |        |
|        | パリンNa <sup>+</sup> ロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（パミロック） | 1筒                    |        |
|        | ワンショット：1日1回<br>（不要の場合は削除）                            |                       |        |
| 注射     | 2 点滴注射（リザーバーより）                                      |                       | ●      |
|        | デキサート注 3.3mg/1mL                                     | 9.9mg                 |        |
|        | アロカリス注 235mg/10mL                                    | 1瓶                    |        |
|        | アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL                                 | 1袋                    |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>30分で                                    |                       |        |
| 注射     | 3 点滴注射（リザーバーより）                                      |                       | ●      |
|        | イリノテカン注<br>（165mg/m <sup>2</sup> ）                   | 165mg/m <sup>2</sup>  |        |
|        | 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）                                 | 250mL                 |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>60分で                                    |                       |        |
| 注射     | 4 点滴注射（リザーバーより）                                      |                       | ●      |
|        | レボホリナート注<br>（200mg/m <sup>2</sup> ）                  | 200mg/m <sup>2</sup>  |        |
|        | 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）                                 | 250mL                 |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>エルプラットと同時に投与<br>120分で                   |                       |        |
| 注射     | 5 点滴注射（リザーバーより）                                      |                       | ●      |
|        | エルプラット注<br>（85mg/m <sup>2</sup> ）                    | 85mg/m <sup>2</sup>   |        |
|        | 5%ブドウ糖注 250mL  | 250mL                 |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>レボホリナートと同時に側管から投与<br>120分で              |                       |        |
| 注射     | 6 点滴注射（リザーバーより）                                      |                       | ●      |
|        | 生理食塩液PL 50mL   | 1瓶                    |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用                                  |                       |        |
| 注射     | 7 点滴注射（リザーバーより）                                      |                       | ●      |
|        | 5-FU注<br>（3200mg/m <sup>2</sup> ）                    | 3200mg/m <sup>2</sup> |        |
|        | 生食注（生理食塩液）100mL（PG）<br>（全量140mLに調製）                  | 1瓶                    |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>type_T（青色タイプで持ち帰り）<br>46時間で             |                       |        |