

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL ロック付	1筒	
	ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパリン)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 (キトルダ)		
注射 3	点滴注射		●
	キトルダ注 (200mg/body)	200mg	
	生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分		
注射 4	点滴注射		●
	ポララミン注 5mg/1mL	1A	
	ガスター注 20mg	1A	
	デキサート注 3.3mg/1mL	16.5mg	
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分		
注射 5	点滴注射		●
	アバスチン注 (15mg/kg)	15mg/kg	
	生食注 (生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL	
	点滴注射：1日1回 30分		
注射 6	点滴注射		●
	パクリタキセル注 (175mg/m ²)	175mg/m ²	
	生理食塩液注【生食】 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分		
注射 7	点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=5)	0mg/A	
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL	
	点滴注射：1日1回 60分		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		