

レジメン名称：C15-204 CPT-11 (d1,8,15) /CDDPmonthly (婦人科癌) 休薬期間：28日

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】ロック付	1筒			
	パリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ペミロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴側管注		●		
	デキサート注 3.3mg / 1ml	9.9mg			
	アロカリス注 235mg / 10mL	1瓶			
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で				
注射 3	点滴側管注		●		
	イリノテカン注 (50-70mg/m ²)	70mg / m ²			
	生理食塩液注 250m l (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 90分で				
注射 4	点滴側管注		●		
	マンニトールS注 300mL / 袋	300mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				

注射	5 点滴側管注		●
	シスプラチン注	80m g / m ²	
	生理食塩液注 250 m l (ソフトバッグ)	250m L	
	(50-80mg/m ²)		
	点滴注射：1日1回		
	ソルデム1本終了後		
	60 分で		
注射	6 点滴側管注		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回		
注射	7 点滴注射		●
	ソルデム 3 A 注 500 m l	500m L	
	点滴注射：1日1回		
	2 時間で		
注射	8 点滴注射		●
	ヴィーン 3 G 注 500 m L	500m L	
	点滴注射：1日1回		
	2 時間で		
注射	9 点滴注射		●
	ヴィーン 3 G 注 500 m L	500m L	
	点滴注射：1日1回		
	60 分で		
注射	10 点滴注射		● ●
	デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6m g	
	アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回		
	30 分で		

注射 11 点滴注射		●	●
イリノテカン注	70m g / m ²		
(50 - 70mg/m ²)			
生理食塩液注 250 m l (ソフトバッグ)	250m L		
点滴注射：1日1回			
90 分で			

注射 12 点滴側管注		●	●
生理食塩液 P L 50 m l	1瓶		
点滴注射：1日1回			