

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射 1	静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20m l ロック付	1筒			
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパロック)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射 2	点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg			
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A			
	ガスター注 20mg	1A			
	アロカリス注 235mg / 10mL	1瓶			
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 3	点滴注射		●		
	生理食塩液 PL 50ml	50mL			
	30分で(PTX投与前の時間確保用)				
	点滴注射：1日1回				
注射 4	点滴注射		●		
	パクリタキセル注 (60mg/m ²)	60mg/m ²			
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射 5	点滴注射		●		
	カルボプラチン (AUC=6)	0mg/A			
	5%ブドウ糖注 250ml	250mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射 6	点滴注射		●		
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射 7	点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg / 1ml	6.6mg			
	ガスター注 20mg	1A			
	ポララミン注 5mg / 1ml	1A			
	生食注 (生理食塩液) 100ml (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射 8	点滴注射			●	●
	生理食塩液 PL 50ml	50mL			
	30分で(PTX投与前の時間確保用)				
	点滴注射：1日1回				
注射 9	点滴注射			●	●
	パクリタキセル注 (60mg/m ²)	60mg/m ²			
	生理食塩液注 250ml (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射 10	点滴注射			●	●
	生理食塩液 PL 50ml	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				