

レジメン名称：P24-301 Pembrolizumab/CDDP/PEM q3w(術前) 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL ロック付	1筒	
		ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ヘパロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2	点滴注射		●
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶	
		点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用(キトルダ)		
注射	3	点滴注射		●
		キイトルーダ注 (200mg/body)	200mg	
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で		
注射	4	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5	点滴側管注		●
		ペムトレキド注 (500mg/m ²)	500mg/m ²	
		生食注(生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL	
		点滴注射：1日1回 10分で		
注射	6	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	7	点滴側管注		●
		シスプラチン注 (75mg/m ²)	75mg/m ²	
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
		点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射	8	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射	9	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 キイトルーダ終了後に開始 90分で		
注射	10	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 90分で		
注射	11	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 60分で		