

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ベリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ベリンロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回		
	リザーバーフラッシュ用 （不要の場合は削除）		
注射 2	点滴注射（リザーバーより）		●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	3.3mg	
	ボラミン注 5mg / 1m l	1A	
	アロカリス注 235mg / 10mL	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 3	点滴注射（リザーバーより）		●
	サイラムザ注 (8mg/kg)	8mg / kg	
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 (全量250mLに調製) (インラインフィルターを使用) 初回60分で投与。忍容性が良好であれば、 2回目以降30分で投与。		
注射 4	点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 5	点滴注射（リザーバーより）		●
	レボホリナート注 (200mg/m ²)	200mg / m ²	
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 120分で		
注射 6	点滴注射（リザーバーより）		●
	イリノテカン注 (150-180mg/m ²)	150mg / m ²	
	生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L	
	点滴注射：1日1回 レボホリナートと同時に側管から投与 90分で		
注射 7	点滴注射（リザーバーより）		●
	5-FU注 (400mg/m ²)	400mg / m ²	
	生理食塩液 P L 50m l	50m L	
	点滴注射：1日1回 レボホリナート終了後全開 4分で		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		
注射 9	点滴注射（リザーバーより）		●
	5-FU注 (2400mg/m ²)	2400mg / m ²	
	生食注（生理食塩液）100m l（P G） (全量140m lに調製)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 type_T（青色タイプで持ち帰り） 46時間で		