

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ヘパロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		(不要の場合は削除)		
注射	2	点滴注射		●
		生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		ライン確保およびフラッシュ用(キトルダ)		
注射	3	点滴注射		●
		キイトルーダ注	200mg	
		(200mg/body)		
		生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用、単独投与		
		30分で		
注射	4	点滴注射		●
		ボララミン注 5mg / 1m l	1A	
		ガスター注 20mg	1A	
		デキサート注 3.3mg / 1m l	16.5mg	
		アロカリス注 235mg / 10m L	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50m L	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	5	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50m l	50m L	
		30分で(PTX投与前の時間確保用)		
		点滴注射：1日1回		
注射	6	点滴注射		●
		パクリタキセル注	175mg / m ²	
		(175mg/m ²)		
		生理食塩液注【生食】 500m l	500m L	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用		
		180分で		
注射	7	点滴注射		●
		カルボプラチン	0mg / A	
		(AUC=5)		
		5%ブドウ糖注 250m l	250m L	
		点滴注射：1日1回		
		60分で		
注射	8	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		