

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ペリナトリウムNa ⁺ 用100単位/mLシリンジ 10mL（ペリナトリウム）	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2	持続点滴		●	
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
		持続点滴：1日1回 トリアキシン終了後、抜去可 メイン			
注射	3	点滴注射		●	
		ボラミン注 5mg/1mL	1A		
		ハイドロコルチゾン注 100mg/2mL	100mg		
		生食注（生理食塩液） 100mL（PG）	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	4	点滴注射		●	
		リツキシマブBS注 （375mg/m ² ）	375mg/m ²		
		生理食塩液注【生食】 500mL （1mg/mLになるように調製）	500mL		
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （リツキシマブの希釈に使用）	1袋		
		点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3-4h。2回目以降2-3h。			
注射	5	点滴注射		●	
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 15分で			
注射	6	点滴注射		●	
		トリアキシン注 （90mg/m ² ）	90mg/m ²		
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 10分で			
注射	7	点滴注射		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	8	静脈内注射		●	
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用			
注射	9	点滴注射			●
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL		
		点滴注射：1日1回 トリアキシン終了後、抜去可 メイン			
注射	10	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		生食注（生理食塩液） 100mL（PG）	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	11	点滴注射			●
		トリアキシン注 （90mg/m ² ）	90mg/m ²		
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 10分で			
注射	12	点滴注射			●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	13	静脈内注射			●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用			