

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ヘパロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射 2	点滴注射		●
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保及びフラッシュ用(キイトルーダ)		
注射 3	点滴注射		●
	キイトルーダ注 (200mg/body)	200m g	
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 30分で		
注射 4	点滴注射		●
	ポララミン注 5m g / 1m l	1A	
	ガスター注 20m g	1A	
	デキサート注 3.3m g / 1m l	16.5m g	
	アロカリス注 235m g / 10m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75m g / 50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 5	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 30分で(PTX投与前の時間確保用)		
注射 6	点滴注射		●
	パクリタキセル注 (175mg/m ²)	175m g / m ²	
	生理食塩液注【生食】 500m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で		
注射 7	点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=5)	0m g / A	
	5%ブドウ糖注 250m l	250m L	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 8	点滴注射		●
	生理食塩液PL 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		