

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	3.3mg		
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3	点滴注射		●	●
		アバスチン注 (5mg/kg)	5mg/kg		
		生食注(生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	4	点滴注射		●	●
		イリノテカン注 (100mg/m ²)	100mg/m ²		
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回 90分で			
注射	5	点滴注射		●	●
		生理食塩液 PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
内服					
	S-1		80mg/m ² 分2 食後		day(1)～(14)服用