

| 分類 No. | 薬剤/手技                                     | 投与量                    | day(1) |
|--------|---|------------------------|--------|
| 注射     | 1 静脈内注射                                   |                        | ●      |
|        | 生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付                   | 1筒                     |        |
|        | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック) | 1筒                     |        |
|        | ワンショット：1日1回<br>(不要の場合は削除)                 |                        |        |
| 注射     | 2 点滴注射                                    |                        | ●      |
|        | デキサート注 3.3 mg / 1 mL                      | 3.3mg                  |        |
|        | アロカリス注 235 mg / 10 mL                     | 1瓶                     |        |
|        | アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL                  | 1袋                     |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>30 分で                        |                        |        |
| 注射     | 3 点滴注射                                    |                        | ●      |
|        | イリノテカン注<br>(150mg/m <sup>2</sup> )        | 150mg / m <sup>2</sup> |        |
|        | 生理食塩液注 250 mL (ソフトバッグ)                    | 250mL                  |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>90 分で                        |                        |        |
| 注射     | 4 点滴注射                                    |                        | ●      |
|        | 生理食塩液 PL 50 mL                            | 1瓶                     |        |
|        | 点滴注射：1日1回<br>フラッシュ用<br>10 分で              |                        |        |