

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】 ロック付	1筒			
		ｹﾞｰｼﾞNaｹﾞｼﾞ用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ｹﾞｰｼﾞロック）	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		（不要の場合は削除）				
注射	2	点滴側管注		●		
		デキサート注 3. 3 m g ／1 m l	9.9m g			
		アロカリス注 2 3 5 m g ／1 0 m L	1瓶			
		アロキシ注バッグ 0.7 5 m g ／5 0 mL	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	3	点滴側管注		●		
		イリノテカン注	60m g /m ²			
		（60mg/m2）				
		生理食塩液注 2 5 0 m l （ソフトバッグ）	250m L			
		点滴注射：1日1回				
		90 分で				
注射	4	点滴側管注		●		
		マンニトールS注 3 0 0 m L /袋	300m L			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
注射	5	点滴側管注		●		
		シスプラチン注	80m g /m ²			
		（80mg/m²）				
		生理食塩液注 2 5 0 m l （ソフトバッグ）	250m L			
		点滴注射：1日1回				
		ソルデム1本終了後				
		60 分で				
注射	6	点滴側管注		●		
		生理食塩液P L 5 0 m l	1瓶			
		フラッシュ用				
		点滴注射：1日1回				
注射	7	点滴注射		●		
		ソルデム3 A注 5 0 0 m l	500m L			
		点滴注射：1日1回				
		2 時間で				
注射	8	点滴注射		●		
		ヴィーン3 G注 5 0 0 m L	500m L			
		点滴注射：1日1回				
		2 時間で				
注射	9	点滴注射		●		
		ヴィーン3 G注 5 0 0 m L	500m L			
		点滴注射：1日1回				
		6 0 分で				
注射	10	点滴注射			●	●
		デキサート注 3. 3 m g ／1 m l	6.6m g			
		アロキシ注バッグ 0.7 5 m g ／5 0 mL	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30 分で				
注射	11	点滴注射			●	●
		イリノテカン注	60m g /m ²			
		（60mg/m2）				
		生理食塩液注 2 5 0 m l （ソフトバッグ）	250m L			
		点滴注射：1日1回				
		90 分で				
注射	12	点滴注射			●	●
		生理食塩液P L 5 0 m l	1瓶			
		フラッシュ用				
		点滴注射：1日1回				