

レジメン名称：P25-201 weekly TC（AUC=2）（CCRT前）（子宮頸癌） 休薬期間：7日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20m l ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg	
		ガスター注 20mg	1A	
		ポララミン注 5mg / 1m l	1A	
		アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3	点滴注射		●
		生理食塩液P L 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回 30分で(PTX投与前の時間確保用)		
注射	4	点滴注射		●
		パクリタキセル注 (80mg/m ²)	80mg / m ²	
		生理食塩液注 250m l（ソフトバッグ）	250m L	
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で		
注射	5	点滴注射		●
		カルボプラチン (AUC=2)	0mg / A	
		5%ブドウ糖注 100m l	100m L	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	6	点滴注射		●
		生理食塩液P L 50m l	1瓶	
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で		