Rheumatoid arthritis

Ivarmacitinib, a selective Janus kinase 1 inhibitor, in patients with moderate-to-severe active rheumatoid arthritis and inadequate response to conventional synthetic DMARDs: results from a phase III randomised clinical trial

Jinjing Liu¹, Ying Jiang¹, Shangzhu Zhang¹, Shengyun Liu², Jingbo Su², Changsong Lin³, Xiaohong He⁴, Rui Wu⁵, Lei Yang⁶, Huaxiang Liu⁷, Xinwang Duan⁸, Shengqian Xu⁹, Hui Luo¹⁰, Jing Liu¹¹, Qibing Xie¹², Cundong Mi¹³, Lin Chen¹⁴, Ning Zhang¹⁵, Huiping Gong¹⁶, Jing Zhu¹⁷, Yasong Li¹⁸, Hua Wei¹⁹, Long Qian²⁰, Jian Wang²¹, Xiaofei Shi²², Hongtao Jin²³, Zhenyu Jiang²⁴, Xi Xie²⁵, Feng Zhan²⁶, Xiuqin Geng²⁷, Zhaohui Zheng²⁸, Zhengfu Du²⁹, Guangchao Dong³⁰, Yuqi Sun³¹, Xiaofeng Zeng^{1,*}

Ann Rheum Dis. 2025 Feb; 84(2): 188-200. PMID 39919893

膠原病 Journal Club 2025/06/10 竹内 遼

FINCH1: Filgotinibのp3 RCT

CLINICAL SCIENCE

Filgotinib versus placebo or adalimumab in patients with rheumatoid arthritis and inadequate response to methotrexate: a phase III randomised clinical trial

Bernard Combe¹, Alan Kivitz², Yoshiya Tanaka³, Désirée van der Heijde⁴, J Abraham Simon⁵, Herbert S B Baraf⁶, Uma Kumar⁷, Franziska Matzkies⁸, Beatrix Bartok⁸, Lei Ye⁸, Ying Guo⁸, Chantal Tasset⁹, John S Sundry^{8,10}, Angelika Jahreis⁸, Mark C Genovese⁸, Neelufar Mozaffarian¹¹, Robert B M Landewé¹², Sang-Cheol Bae¹³, Edward C Keystone¹⁴, Peter Nash¹⁵

MTX効果不十分なRAに対する
filgotinibのp3 RCT
(FINCH1)

	FIL200 (n=475)	FIL100 (n=480)	ADA (n=325)	PBO (n=475)
Primary outcome				
ACR20, week 12				
n/N	364/475	335/480	229/325	237/475
% (95% CI)	76.6 (72.7 to 80.5)	69.8 (65.6 to 74.0)	70.5 (65.3 to 75.6)	49.9 (45.3 to 54.5)
Difference vs PBO (95% CI)†	26.7 (20.6 to 32.8)	19.9 (13.6 to 26.2)	20.6 (13.6 to 27.5)	
P value vs placebo	<0.001	<0.001	<0.001‡	

- 12週におけるACR20を達成した患者の割合

Filgotinib 200mg 76.6%

Filgotinib 100mg 69.8%

Adalimumab 40mg 2週おき 70.5%

Placebo群 49.9%

Ann Rheum Dis 2021; 80: 848-858.

Ivarmacitinib: JAK1 selective inhibitor

Compound	Primary target (s)	IC ₅₀ in cell free assays (nM)				Approved doses (Phase III studies)
		JAK1	JAK2	JAK3	TYK2	
Tofacitinib	JAK3, JAK2, TYK2, JAK1	112	20	1	34	≤ 10 mg b.i.d. (UC)*
Filgotinib	JAK1, JAK2	10	28	810	116	200 mg q.d. (UC)
Upadacitinib	JAK1, JAK2	47	120	2300	4700	30 mg q.d. (UC)
Brepocitinib	JAK1, TYK2	17	77	6490	23	-
Ivarmacitinib	JAK1	0.1	0.9	7.7	42	-

- Ivarmacitinib: JAK1 selective inhibitor
- IvarmacitinibはFilgotinibよりもJAK1選択性が高い

IC₅₀
タンパク質の活性阻害する
のに必要な濃度
IC₅₀が低いほど強かに阻害

Methods

P 2010年ACR/EULAR分類基準を満たす
18歳から75歳のRA患者

I csDMARDs+ Ivarmacitinib

C csDMARDs+ Placebo

O 24週における
ACR20を達成した患者の割合

csDMARDs
メトレキサート
レフルノミド
ヒドロキシクロロキン
イグラチモド
スルファサラジン
クロロキン

Methods: End Point

Primary End Point:

- 24週におけるACR20を達成した患者の割合

Secondary End Point:

- 24、52週における
  - ACR20/50/70を達成した患者の割合
  - DAS28 < 2.6、DAS28-CRP ≤ 3.2を達成した患者の割合
  - DAS28-CRP、DAS28-ESR、CDAI、SDAI
  - 朝のこわばりの持続時間、重症度
- QOL End point
  - HAQ-DIのベースラインからの変化
  - SF-36 PCS、MCSのベースラインからの変化 etc...
- 有害事象
  - 感染、悪性腫瘍、血栓イベント、MACE etc...

Methods: Participants

■ Inclusion criteria

- 18-75歳
- 2010年ACR/EULARのRAの分類基準を満たす
- 腫脹、圧痛関節はそれぞれ6関節以上
- 1剤以上のcsDMARDsを3か月以上使用
- ESR > 28mm/h、CRP、hs-CRP > 0.5mg/dL
- 3か月以上csDMARDsの変更なし
- 4週間以上csDMARDsの錠数の変更なし
- csDMARDsの併用は2剤まで
- 内服のグルココルチコイドはPSL 10mg相当まで可
(グルココルチコイドの新規開始、増量は不可)

■ Exclusion criteria

- JAK阻害薬の使用歴
- 血球異常
(WBC < 3,000/ μ L、Neut < 1,500/ μ L、Hb < 9.0g/dL、
Plt < 100,000/ μ L)
- 肝機能異常
- eGFR < 60mL/分/1.73m²

Methods: 患者背景

	Placebo	Ivarmacitinib 4mg	Ivarmacitinib 8mg
Characteristics	Placebo (n = 188)	Ivarmacitinib 4 mg (n = 189)	Ivarmacitinib 8 mg (n = 189)
Age, years	50.9±9.9	49.7±10.4	49.8±11.0
Female	161 (85.6)	172 (91.0)	158 (83.6)
Time since RA diagnosis, years	9.9±7.3	10.1±8.0	9.2±7.4
≥3 years	154 (81.9)	153 (81.0)	149 (78.8)
<3 years	34 (18.1)	35 (18.5)	40 (21.2)
ACR functional class			
I	21 (11.2)	27 (14.3)	23 (12.2)
II	118 (62.8)	105 (55.6)	116 (61.4)
III	49 (26.1)	57 (30.2)	50 (26.5)
csDMARDs use at baseline	184 (97.9)	180 (95.2)	184 (97.4)
Methotrexate	107 (56.9)	104 (55.0)	100 (52.9)
Leflunomide	72 (38.3)	74 (39.2)	79 (41.8)
Hydroxychloroquine	39 (20.7)	24 (12.7)	25 (13.2)
Iguratimod	14 (7.4)	16 (8.5)	16 (8.5)
Sulfasalazine	6 (3.2)	7 (3.7)	5 (2.6)
Chloroquine	0	1 (0.5)	0
NSAIDs	84 (44.7)	70 (37.0)	86 (45.5)
Oral glucocorticoid use	69 (36.7)	76 (40.2)	58 (30.7)
Dose, mg (prednisone equivalent)	5.9±2.6	6.1±2.7	6.2±2.7
Previous biologic DMARDs received*	50 (26.6)	52 (27.5)	43 (22.8)
TNF-α inhibitor	37 (19.7)	35 (18.5)	33 (17.5)
IL-6 inhibitor	17 (9.0)	21 (11.1)	7 (3.7)
CRP, mg/L [†]	15.5±17.7	18.7±20.0	19.4±18.9
ESR, mm/hour	44.5±24.1	48.2±27.7	47.5±23.6
RF-positive	158 (84.0)	155 (82.0)	155 (82.0)
Anti-CCP-positive	169 (89.9)	166 (87.8)	170 (89.9)
SJC [‡]	12.1±6.4	12.9±7.8	11.9±6.0
TJC [‡]	20.9±11.6	21.1±14.1	20.7±13.1
PtGA, 0–100 mm VAS	61.3±19.0	60.3±21.0	61.3±18.9
PGA, 0–100 mm VAS	61.6±14.3	60.9±15.7	61.6±15.3
Pain, 0–100 mm VAS	59.6±18.7	57.5±21.0	58.1±19.5
DAS28(CRP)	5.2±0.8	5.2±0.9	5.3±0.9
DAS28(ESR)	6.3±0.9	6.2±1.0	6.3±0.9
CDAI	35.4±10.5	35.0±12.2	35.1±11.7
SDAI score	37.0±10.8	36.8±12.8	37.1±12.4
HAQ-DI	1.2±0.7	1.2±0.6	1.1±0.6
SF-36 PCS	35.5±6.7	35.8±7.4	35.6±7.0
SF-36 MCS	42.1±10.8	40.8±10.8	41.8±10.9
Morning stiffness duration, min	52.7±63.7	64.1±81.9	61.6±82.2
Morning stiffness severity, 0–100 mm VAS	45.7±24.1	45.4±25.7	46.5±25.5

年齢は50歳程度、女性が8～9割

csDMARDsは95%程度が内服、MTXは5割程度

RF陽性は8割程度、ACPA陽性は9割程度

腫脹関節数は12程度、圧痛関節数は20程度

CDAIは35程度で高疾患活動性

Results: Primary End Point

Efficacy endpoints at week 24 in the full analysis set

Endpoints	Placebo (n = 188)	Ivarmacitinib 4 mg (n = 189)	Ivarmacitinib 8 mg (n = 189)
<i>Primary endpoint</i>			
ACR20 response	76 (40.4)	133 (70.4)	142 (75.1)
Difference vs placebo, % (95% CI)	–	30.1 (20.6 to 39.7)*	34.8 (25.4 to 44.1)*

24週においてACR20を達成した患者の割合

- Placebo 40.4%
- Ivarmacitinib 4mg 70.4%
- Ivarmacitinib 8mg 75.1%
- Ivarmacitinib 4mg、8mgはPlacebo群と比較して有意差が示された (P< 0.0001)

Results: 24週のACR20/50/70を達成した患者の割合

24週においてACR50を達成した患者の割合

- Placebo 15.4%
- Ivarmacitinib 4mg 46.0%
- Ivarmacitinib 8mg 75.1%

24週においてACR70を達成した患者の割合

- Placebo 6.9%
- Ivarmacitinib 4mg 22.2%
- Ivarmacitinib 8mg 31.7%

(A) ACR20/50/70 responses at Week 24

24週におけるACR50、70を達成した患者の割合は、Ivarmacitinib 4mg、8mgともに Placebo群と比較して有意差が示された(P< 0.0001、多重調整なし)

Results: 52週までのACR20/50/70を達成した患者の割合

ACR20

ACR50

ACR70

2、4、8週目の時点でIvarmacitinib 4mg、8mg群の方がPlacebo群よりもACR 20/50/70を達成した患者した患者は多かった

Results: DAS28-CRP、CDAI、SDAIにおける寛解、低疾患活動性

	Placebo	Ivarmacitinib 4mg	Ivarmacitinib 8mg
DAS28(CRP) <2.6	9 (4.8)	56 (29.6)	74 (39.2)
Difference vs placebo, % (95% CI)	–	24.9 (17.7 to 32.1) [†]	34.3 (26.7 to 41.9) [†]
DAS28(CRP) ≤3.2	29 (15.4)	87 (46.0)	108 (57.1)
Difference vs placebo, % (95% CI)	–	30.8 (22.0 to 39.5) [†]	41.7 (33.0 to 50.4) [†]
CDAI ≤2.8 [§]	2 (1.1)	22 (11.6)	30 (15.9)
Difference vs placebo, % (95% CI)	–	10.7 (5.8 to 15.5) [†]	14.8 (9.4 to 20.2) [†]
CDAI ≤10 [§]	28 (14.9)	73 (38.6)	92 (48.7)
Difference vs placebo, % (95% CI)	–	23.8 (15.2 to 32.4) [†]	33.8 (25.0 to 42.5) [†]
SDAI ≤3.3 [§]	2 (1.1)	25 (13.2)	32 (16.9)
Difference vs placebo, % (95% CI)	–	12.2 (7.2 to 17.3) [†]	15.9 (10.3 to 21.4) [†]
SDAI ≤11 [§]	27 (14.4)	74 (39.2)	94 (49.7)
Difference vs placebo, % (95% CI)	–	24.9 (16.4 to 33.5) [†]	35.4 (26.7 to 44.1) [†]

24週における

DAS28-CRP<2.6、 DAS28-CRP≤3.2

CDAI≤ 2.8、 CDAI≤ 10

SDAI≤ 3.3、 SDAI≤ 11を達成した患者の割合

Ivarmacitinib 4mg、 8mgともPlacebo群と比較して有意差が示された(P< 0.001、 多重調整なし)

Results: DAS28-CRP、CDAI、SDAIの変化

DAS28-CRP

CDAI

SDAI

- 治療開始早期から24週までIvarmacitinib 4mg、8mg群の方がPlacebo群よりもDAS28-CRP、CDAI、SDAIともに改善していた
- Placebo群は24週からIvarmacitinib 4mgを開始することで、Ivarmacitinib 4mg群と同程度のDAS28-CRP、CDAI、SDAIに改善した

Results: Patient-reported outcomes(PRO)

	Placebo	Ivamacitinib 4mg	Ivamacitinib 8mg
HAQ-DI improvement of $\geq 0.22^{**}$	83/172 (48.3)	121/176 (68.8)	125/172 (72.7)
Difference vs placebo, % (95% CI)	-	20.7 (10.5 to 30.8) [†]	24.5 (14.5 to 34.5) [†]
HAQ-DI improvement of $\geq 0.3^{§,††}$	66/166 (39.8)	110/173 (63.6)	112/164 (68.3)
Difference vs placebo, % (95% CI)	-	24.1 (13.8 to 34.3) [†]	28.6 (18.4 to 38.9) [†]
HAQ-DI $< 0.5^§$	45 (23.9)	80 (42.3)	88 (46.6)
Difference vs placebo, % (95% CI)	-	18.7 (9.5 to 27.9) [†]	22.7 (13.4 to 32.0) [†]
SF-36 PCS LS mean (95% CI), mean difference from baseline	1.78 (0.67 to 2.89)	5.62 (4.52 to 6.71)	6.43 (5.33 to 7.53)
Change vs placebo, LS mean (95% CI), mean difference from baseline	-	3.84 (2.57 to 5.10) [†]	4.65 (3.39 to 5.91) [†]
SF-36 MCS LS mean (95% CI), mean difference from baseline	-0.22 (-1.68 to 1.25)	2.85 (1.40 to 4.29)	4.04 (2.58 to 5.50)
Change vs placebo, LS mean (95% CI), mean difference from baseline	-	3.06 (1.39 to 4.73) [†]	4.26 (2.58 to 5.93) [†]

24週における

HAQ-DIが0.22以上、0.3以上改善した患者の割合、HAQ-DI<0.5を満たす患者の割合

SF-36 PCS(身体要素の得点)、MCS(精神要素の得点)の最小二乗

Ivamacitinib 4mg、8mgともPlacebo群と比較して有意差が示された

($P < 0.0001$ 、多重調整なし)

Results: 有害事象

TEAEs, n (%)	Placebo-controlled period (weeks 0–24)			Extension period (weeks 24–52)		
	Placebo (n = 188)	Ivarmacitinib 4 mg (n = 189)	Ivarmacitinib 8 mg (n = 189)	Placebo-Ivarmacitinib 4 mg (n = 168)	Ivarmacitinib 4 mg (n = 180)	Ivarmacitinib 8 mg (n = 171)
TEAEs	149 (79.3)	154 (81.5)	171 (90.5)	137 (81.5)	143 (79.4)	145 (84.8)
Mild	103 (54.8)	99 (52.4)	112 (59.3)	84 (50.0)	102 (56.7)	95 (55.6)
Moderate	43 (22.9)	53 (28.0)	53 (28.0)	45 (26.8)	34 (18.9)	47 (27.5)
Severe	3 (1.6)	2 (1.1)	6 (3.2)	8 (4.8)	7 (3.9)	3 (1.8)
Treatment-related TEAEs	92 (48.9)	107 (56.6)	121 (64.0)	99 (58.9)	86 (47.8)	109 (63.7)
TEAEs leading to dose discontinuation	5 (2.7)	3 (1.6)	7 (3.7)	2 (1.2)	3 (1.7)	1 (0.6)
TEAEs leading to dose interruption	9 (4.8)	15 (7.9)	20 (10.6)	9 (5.4)	18 (10.0)	12 (7.0)
Infection-related TEAEs	64 (34.0)	76 (40.2)	77 (40.7)	49 (29.2)	59 (32.8)	58 (33.9)
TESAEs*	5 (2.7)	8 (4.2)	12 (6.3)	13 (7.7)	8 (4.4)	9 (5.3)
Prespecified TEAEs of special interest	0	2 (1.1)	3 (1.6)	2 (1.2)	4 (2.2)	1 (0.6)
Serious infection [†]	0	0	1 (0.5)	0	0	0
Any systemic opportunistic infection [‡]	0	0	0	0	0	1 (0.6)
Newly diagnosed malignancy	0	1 (0.5)	0	0	2 (1.1)	0
Thromboembolic event [§]	0	0	1 (0.5)	1 (0.6)	0	0
MACE [¶]	0	0	1 (0.5)	1 (0.6)	0	0
Liver function abnormality**	0	1 (0.5)	1 (0.5)	0	2 (1.1)	0
Other TEAEs of special interest						
Herpes zoster	4 (2.1)	3 (1.6)	5 (2.6)	3 (1.8)	1 (0.6)	4 (2.3)
Haemoglobin, g/L	-1.7±12.1	5.4±10.2	7.4±11.0	7.5±12.1	6.8±11.2	7.4±11.5
Grade 3 anaemia, n (%)*	3 (1.6)	0	1 (0.5)	0	2 (1.1)	1 (0.6)
Neutrophils, 10 ⁹ /L	-0.3±1.6	-0.9±1.6	-1.1±1.6	-0.6±1.6	-0.9±1.7	-1.0±1.9
Grade 3 neutrophil count decreased, n (%)*	0	0	3 (1.6)	1 (0.6)	1 (0.6)	3 (1.8)
Grade 4 neutrophil count decreased, n (%)*	0	0	0	0	1 (0.6)	1 (0.6)
Lymphocytes, 10 ⁹ /L	0.0±0.5	0.1±0.5	0.2±0.4	0.0±0.5	0.0±0.5	0.0±0.4
Grade 3 lymphopenia, n (%)*	1 (0.5)	1 (0.5)	5 (2.6)	1 (0.6)	4 (2.2)	7 (4.1)
Platelets, 10 ⁹ /L	-5.2±51.1	-54.9±63.5	-68.8±61.3	-46.7±51.9	-57.2±65.4	-65.8±60.8
Grade 3 platelet count decreased, n (%)*	0	1 (0.5)	0	0	1 (0.6)	0
Grade 4 platelet count decreased, n (%)*	0	0	1 (0.5)	0	0	0
White cell count, 10 ⁹ /L	-0.3±1.7	-0.9±1.7	-1.0±1.7	-0.6±1.6	-1.1±1.9	-1.1±2.0
Grade 3 white cell count decreased, n (%)*	0	0	1 (0.5)	1 (0.6)	1 (0.6)	2 (1.2)

- Ivarmacitinib 8mgでAEは増加
- 感染症は増加
- 帯状疱疹は増加しない
- 悪性腫瘍はIvarmacitinib群で3例のみ
- MACEはIvarmacitinib群で1例のみ
- Hbは増加、WBC、Pltは減少

Discussion

- RAに対する他のJAK阻害薬におけるp3のRCTと12、24週におけるACR20達成率がほぼ同じ
- Ivarmacitinib 8mgは4mgの場合やplacebo群に比べて有害事象が多い
- JAK阻害薬に特徴的な悪性腫瘍、血栓イベント、MACE、帯状疱疹は増加しない

Limitation

- 対象が中国人のみである
- IvarmacitinibとcsDMARDsを24週しか比較できていない