

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(8)	day(9)	day(15)	day(16)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回	1筒 1筒	●	●	●	●	●	●
注射	2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL ポララミン注 5mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6A 1A 100mL	●				●	
注射	3	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分以上かけて	1瓶	●				●	
注射	4	点滴注射 ダラザレックス注 （16mg/kg） 生理食塩液注【生食】 500mL 点滴注射：1日1回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に 50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。	16mg/kg 500mL	●				●	
注射	5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 ダラザレックスフラッシュ用	1瓶	●				●	
注射	6	点滴注射 カイプロリス注 （56mg/m ² ） 注射用蒸留水 100mL（PG） （カイプロリス溶解用） 5%ブドウ糖注 100mL 点滴注射：1日1回 30分で	56mg/m ² 1瓶 100mL	●					
注射	7	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 カイプロリスフラッシュ用	1瓶	●					
注射	8	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6A 100mL		●	●	●		●
注射	9	点滴注射 カイプロリス注 （56mg/m ² ） 注射用蒸留水 100mL（PG） （カイプロリス溶解用） 5%ブドウ糖注 100mL 点滴注射：1日1回 30分で	56mg/m ² 1瓶 100mL		●	●	●	●	●
注射	10	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 カイプロリスフラッシュ用	1瓶		●	●	●	●	●
内服		レナデックス	40mg/日 分1食後						