

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		デキサート注 3.3 mg / 1 mL	16.5 mg	
		ポララミン注 5 mg / 1 mL	1 A	
		ガスター注 20 mg	1 A	
		アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30 分で		
注射	3	点滴注射		●
		トラスツズマブBS注	6 mg / kg	
		（6mg/kg）		
		生理食塩液注 250 mL（ソフトバッグ）	250 mL	
		点滴注射：1日1回		
		2回目以降30分可。		
注射	4	点滴注射		●
		パクリタキセル注	175 mg / m ²	
		（175mg/m ² ）		
		生理食塩液注 【生食】 500 mL	500 mL	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用		
		3 時間で		
注射	5	点滴注射		●
		カルボプラチン	0 mg / A	
		（AUC=6）		
		5%ブドウ糖注 250 mL	250 mL	
		点滴注射：1日1回		
		60 分で		
注射	6	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50 mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		
		10 分で		
注射	7	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		フラッシュ用		
		（不要の場合は削除）		