

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射 1	点滴注射		●	●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒					
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	1筒					
	点滴注射：1日1回						
	(不要の場合は削除)						
注射 2	点滴注射		●				
	デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg					
	アロキシ注バッグ 0.75mg / 50mL	1袋					
	点滴注射：1日1回						
	30分で						
注射 3	点滴注射		●				
	【要時】 コスメゲン注	500μg					
	(500μg/B)						
	注射用水 20mL	1.1mL					
	(1VあたりDW1.1mLで溶解)						
	生理食塩液P L 50m l	50mL					
	点滴注射：1日1回						
	全開で						
注射 4	点滴注射		●				
	5-FU注	1500mg					
	(1500mg/B)						
	生理食塩液注【生食】 500m l	500mL					
	点滴注射：1日1回						
	8時間で						
注射 5	点滴注射		●				
	生理食塩液P L 50m l	1瓶					
	点滴注射：1日1回						
	フラッシュ用						
注射 6	静脈内注射		●				
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒					
	ワンショット：1日1回						
	(不要の場合は削除)						
	フラッシュ用						
注射 7	点滴注射			●	●	●	●
	デキサート注 3.3mg / 1m l	6.6mg					
	生食注(生理食塩液) 100m l (PG)	100mL					
	点滴注射：1日1回						
	30分で						
注射 8	点滴注射			●	●	●	●
	【要時】 コスメゲン注	500μg					
	(500μg/B)						
	注射用水 20mL	1.1mL					
	(1VあたりDW1.1mLで溶解)						
	生理食塩液P L 50m l	50mL					
	点滴注射：1日1回						
	全開で						
注射 9	点滴注射			●	●	●	●
	5-FU注	1500mg					
	(1500mg/B)						
	生理食塩液注【生食】 500m l	500mL					
	点滴注射：1日1回						
	8時間で						
注射 10	点滴注射			●	●	●	●
	生理食塩液P L 50m l	1瓶					
	点滴注射：1日1回						
	フラッシュ用						
注射 11	静脈内注射			●	●	●	●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒					
	ワンショット：1日1回						
	(不要の場合は削除)						
	フラッシュ用						