

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック) ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)	1筒 1筒	●
注射	2	持続点滴 ソルデム3A注 500mL ★ 20mL メイロン84注 持続点滴：1日1回 メイン 360分で	500mL 1A	●
注射	3	点滴注射 ポラミン注 5mg/1mL ハイドロコト注 100mg/2mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	1A 100mg 100mL	●
注射	4	点滴注射 リツキシマブBS注 (375mg/m ²) 生理食塩液注【生食】 500mL (1mg/mLになるように調製) 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） (リツキシマブの希釈に使用) 点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3-4h。2回目以降2-3h。	375mg/m ² 500mL 1袋	●
注射	5	点滴注射 水溶性プレドニン注 40mg/m ² ・Max100mg/B アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 15分で	40mg/m ² 1袋	●
注射	6	点滴注射 アドリアシン注 (25mg/m ²) 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	25mg/m ² 100mL	●
注射	7	点滴注射 オンコビン注 (1mg/Body) 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 全開。	1mg 50mL	●
注射	8	点滴注射 エンドキサン注 (400mg/m ²) 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 90分で	400mg/m ² 250mL	●
注射	9	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●
注射	10	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 フラッシュ用 (不要の場合は削除)	1筒	●
内服		プレドニゾン 分1食後	40mg/m ²	day(2)～(5)服用