

レジメン名称：P21-201 Pembrolizumab/nab-PTX(d1,8) triweekly 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNa液用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射	2	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 ライン確保およびフラッシュ用（キートルーダ）	1瓶	●	
注射	3	点滴注射 キートルーダ注 （200mg/body） 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で	200mg 100mL	●	
注射	4	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で キートルーダと別（フィルターなし）ルートで。	6.6mg 100mL	●	
注射	5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 アブリキサ投与前後フラッシュ用	1瓶	●	
注射	6	点滴注射 アブラキサン注 （100mg/mL） 生理食塩液PL 50mL （1mLあたり20mLで溶解） 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で	100mg/mL 50mL	●	
注射	7	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●	
注射	8	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 100mL		●
注射	9	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 アブリキサ投与前後フラッシュ用	1瓶		●
注射	10	点滴注射 アブラキサン注 （100mg/mL） 生理食塩液PL 50mL （1mLあたり20mLで溶解） 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 30分で	100mg/mL 50mL		●
注射	11	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒		●