

レジメン名称：H18-302 HER/XP（1回目） 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNa封入用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●
注射	2	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 （ブライミング用）	1瓶	●
注射	3	点滴側管注 プロイメンド注 150mg 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で	150mg 100mL	●
注射	4	点滴側管注 アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL デキサート注 3.3mg/1mL 点滴注射：1日1回 15分で	1袋 9.9mg	●
注射	5	点滴側管注 ハーセプチン注 （初回のみ8mg/kg） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 初回：90分	8mg/kg 250mL	●
注射	6	点滴側管注 マンニトールS注 300mL/袋 点滴注射：1日1回 30分で	300mL	●
注射	7	点滴側管注 シスプラチン注 （80mg/m ² ） 生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で	80mg/m ² 250mL	●
注射	8	点滴注射 ソルデム3A注 500mL 点滴注射：1日1回 2時間で	500mL	●
注射	9	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 2時間で	500mL	●
注射	10	点滴注射 ヴィーン3G注 500mL 点滴注射：1日1回 60分で	500mL	●
注射	11	点滴側管注 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 （フラッシュ用）	1瓶	●
注射	12	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●
内服				
		カベシタピン	2000mg/m ² 分2 食後	day(1)～(14)服用