

レジメン名称：F15-203 high dose FP(5-FU:96時間,インフルーザー)monthly 休薬期間：28日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNaサック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンサック)	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
注射	2	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 90分で		
注射	3	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 60分で		
注射	4	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 (プライミング用)		
注射	5	点滴側管注		●
		プロイメンド注 150mg	150mg	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から。 30分で		
注射	6	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 15分で		
注射	7	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	8	点滴側管注		●
		シスプラチン注 (80mg/m ²)	80mg/m ²	
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
		点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射	9	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 (フラッシュ用)		
注射	10	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用		
注射	11	点滴注射(リザーバーより)		●
		5-FU注 (4000mg/m ²)	4000mg/m ²	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回 LV2で全量185mLに調製。 96時間で		