

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(22)	day(29)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック） ワンショット：1日1回	1筒 1筒	●		●	
注射	2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL ボララミン注 5mg/1mL 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分で	6A 1A 100mL	●		●	
注射	3	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 30分以上かけて	1瓶	●		●	
注射	4	点滴注射 ダラザレックス注 （16mg/kg） 生理食塩液注【生食】 500mL 点滴注射：1日1回 最初1時間は100mL/hで開始、1時間毎に 50mL/hずつ上げ、200mL/hまで。 インラインフィルターを使用。	16mg/kg 500mL	●		●	
注射	5	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回	1瓶	●		●	
注射	6	皮下注射 ベルケイド注 （1.3mg/mL） 生理食塩液注 20mL （1Vあたり1.2mLで溶解） ワンショット：1日1回	1.3mg/mL 1.2mL	●	●	●	●
注射	7	静脈内注射 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用	1筒	●		●	
内服		メルファラン	9mg/mL 分1 食後		day(1)～(4)服用		
内服		プレドニゾロン	60mg/mL 分1 食後		day(2)～(4)服用		