

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL(ヘパミロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 ライン確保及びフラッシュ用(キイトルーダ)			
注射	3	点滴注射		●	
		キイトルーダ注 (200mg/body)	200mg		
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で			
注射	4	点滴注射		●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	5	点滴注射		●	●
		ジェムザール注 (1000mg/m ²)	1000mg/m ²		
		5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
		点滴注射：1日1回 30分で			
注射	6	点滴注射		●	●
		カルボプラチン (AUC=2)	0mg/A		
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL		
		点滴注射：1日1回 60分で			
注射	7	点滴注射		●	●
		生理食塩液 PL 50mL	50mL		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で			
注射	8	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除) フラッシュ用			