

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)
注射	1	点滴注射		●				
		デキサート注 3. 3 m g / 1 m l	5 A					
		アロキシ注バッグ 0.7 5 m g / 5 0 m L	1袋					
		点滴注射：1日1回						
		30 分で						
注射	2	点滴注射		●				
		エンドキサン注	200m g / m ²					
		(200m g / m ²)						
		生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L					
		点滴注射：1日1回						
		90 分で						
注射	3	点滴注射		●				
		パラミン注 5 m g / 1 m l	1 A					
		生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	100m L					
		点滴注射：1日1回						
		30 分で						
注射	4	点滴注射		●				
		リツキシマブBS注	375m g / m ²					
		(375mg/m ²)						
		生理食塩液注【生食】 5 0 0 m l	500m L					
		(1mg/mLになるように調製)						
		生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	1袋					
		(リツキシマブの希釈に使用)						
		点滴注射：1日1回						
		初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ						
		400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30						
		分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。						
		3-4h。2回目以降2-3h。						
注射	5	点滴注射		●				
		生理食塩液 P L 5 0 m l	1瓶					
		点滴注射：1日1回						
		フラッシュ用						
注射	6	持続点滴		●				
		ソルデム 3 A 注 5 0 0 m l	500m L					
		★ 2 0 m l メイロン 8 4 注	1 A					
		持続点滴：1日1回						
		12時間で						
注射	7	持続点滴		●				
		ソルデム 3 A 注 5 0 0 m l	500m L					
		★ 2 0 m l メイロン 8 4 注	1 A					
		持続点滴：1日1回						
		12時間で						
注射	8	静脈内注射		●				
		生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】ロック付	1筒					
		ワンショット：1日1回						
		(不要の場合は削除)						
		フラッシュ用						
注射	9	点滴注射			●	●	●	●
		生食注 (生理食塩液) 1 0 0 m l (P G)	1瓶					
		点滴注射：1日1回						
		ルート確保用およびフラッシュ用						
注射	10	点滴注射			●	●	●	●
		エンドキサン注	200m g / m ²					
		(200m g / m ²)						
		生理食塩液注 2 5 0 m l (ソフトバッグ)	250m L					
		点滴注射：1日1回						
		90 分で						
注射	11	持続点滴			●	●	●	●
		ソルデム 3 A 注 5 0 0 m l	500m L					
		★ 2 0 m l メイロン 8 4 注	1 A					
		持続点滴：1日1回						
		12時間で						
注射	12	持続点滴			●	●	●	●
		ソルデム 3 A 注 5 0 0 m l	500m L					
		★ 2 0 m l メイロン 8 4 注	1 A					
		持続点滴：1日1回						
		12時間で						
注射	13	静脈内注射			●	●	●	●
		生食注シリンジ 2 0 m l 【要時】ロック付	1筒					
		ワンショット：1日1回						
		(不要の場合は削除)						
		フラッシュ用						