

休薬期間：21日

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●	●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ヘパリンNaock用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパリンロック）	1筒		
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2 点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL （10A/body）	10A		
	ボラミン注 5mg/1mL	1A		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3 点滴側管注		●	
	リツキシマブBS注 （375mg/m ² ）	375mg/m ²		
	生理食塩液注【生食】 500mL （1mg/mLになるように調製）	500mL		
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ） （リツキシマブの希釈に使用）	1袋		
	点滴注射：1日1回 初回50mL/hで開始。30分毎に50mL/hずつ上げ 400mL/hまで。2回目以降100mL/hで開始。30 分毎に100mL/hずつ上げ400mL/hまで。 3-4h。2回目以降2-3h。			
注射	4 点滴側管注		●	
	ジェムザール注 （1000mg/m ² ）	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	5 点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	6 静脈内注射		●	
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用			
注射	7 点滴注射			●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	8 点滴側管注			●
	ジェムザール注 （1000mg/m ² ）	1000mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 100mL	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	9 点滴注射			●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	10 静脈内注射			●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用			
内服				
	デキサメタゾン	40mg/日 分1食後		day(2)～(4)服用