

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(22)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘミロック）	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2	点滴注射		●	
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 ライン確保用			
注射	3	点滴注射		●	
		オブジーボ注 (360mg/Body)	360mg		
		生食注（生理食塩液） 50mL（ソフトバッグ）	50mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で			
注射	4	点滴注射		●	
		生食注（生理食塩液） 100mL（PG）	1瓶		
		点滴注射：1日1回 投与間隔30分確保用 30分で			
注射	5	点滴注射		●	
		ヤーボイ注 (1mg/kg)	1mg/kg		
		生理食塩液 PL 50mL （全量30mLに調製）	30mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で			
注射	6	点滴注射		●	
		生理食塩液 PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	7	静脈内注射		●	
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用			
注射	8	点滴注射			●
		生食注（生理食塩液） 100mL（PG）	1瓶		
		点滴注射：1日1回 ライン確保及びフラッシュ用			
注射	9	点滴注射			●
		オブジーボ注 (360mg/Body)	360mg		
		生食注（生理食塩液） 50mL（ソフトバッグ）	50mL		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 30分で			
注射	10	静脈内注射			●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒		
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用			