

レジメン名称：P18-304 Pembrolizumab/CDDP/PEM q3w 1-4c

休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパリック)	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		(不要の場合は削除)		
注射	2	点滴注射		●
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		ライン確保およびフラッシュ用（キトルダ）		
注射	3	点滴注射		●
		キイトルーダ注	200mg	
		(200mg/body)		
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用、単独投与		
		30分で		
注射	4	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	5	点滴側管注		●
		ペトリキッド注	500mg/m ²	
		(500mg/m ²)		
		生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ）	50mL	
		点滴注射：1日1回		
		10分で		
注射	6	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	7	点滴側管注		●
		シスプラチン注	75mg/m ²	
		(75mg/m ²)		
		生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
		点滴注射：1日1回		
		ソルデム1本終了後		
		60分で		
注射	8	点滴注射		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		フラッシュ用		
注射	9	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		キイトルーダ終了後に開始		
		90分で		
注射	10	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		90分で		
注射	11	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回		
		60分で		