

レジメン名称：P21-301 Pembrolizumab/FP triweekly（食道癌） 休業期間：21日

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射 1	静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ヘパリンNaサック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパリック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射 2	点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保及びフラッシュ用（キトルダ）		
注射 3	点滴注射		●
	キトルダ注 （200mg/body）	200mg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30分で		
注射 4	点滴側管注		●
	プロイメンド注 150mg	150mg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 ソルデム3Aと同時に側管から 30分で		
注射 5	点滴側管注		●
	デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
	アロキン注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 15分で		
注射 6	点滴側管注		●
	マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射 7	点滴側管注		●
	シスプラチン注 （80mg/mL）	80mg/mL	
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL	
	点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射 8	点滴側管注		●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 （フラッシュ用）		
注射 9	点滴注射		●
	ソルデム3A注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 キトルダ終了後に開始 90分で		
注射 10	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 11	点滴注射		●
	ヴィーン3G注 500mL	500mL	
	点滴注射：1日1回 60分で		
注射 12	静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒	
	ワンショット：1日1回 フラッシュ用 （不要の場合は削除）		
注射 13	点滴注射（リザーバーより）		●
	5-FU注 （4000mg/mL）	4000mg/mL	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 LV2で全量230mLに調製。 120時間で		