

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100 mL (PG)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用 ライン確保及びフラッシュ用 (キトルダ)		
注射	3 点滴注射		●
	キイトルーダ注 (200mg/body)	200mg	
	生食注 (生理食塩液) 100 mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルター使用、単独投与 30分で		
注射	4 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 mg / 1 mL	9.9mg	
	アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	5 点滴注射		●
	アドリアシン注 (60mg / m ²)	60mg / m ²	
	生食注 (生理食塩液) 100 mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	6 点滴注射		●
	エンドキサン注 (600mg / m ²)	600mg / m ²	
	生食注 (生理食塩液) 100 mL (PG)	100mL	
	点滴注射：1日1回 15 分で		
注射	7 点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50 mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		