

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用 (キトルダ*)		
注射	3 点滴注射		●
	キイトルーダ注 (200mg/body)	200m g	
	生食注 (生理食塩液) 100m l (P G)	100m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30 分で		
注射	4 点滴注射		●
	ポララミン注 5m g / 1m l	1 A	
	ガスター注 20m g	1 A	
	デキサート注 3. 3m g / 1m l	16.5m g	
	アロカリス注 235m g / 10m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75m g / 50m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5 点滴注射		●
	パクリタキセル注 (200mg/m ²)	200m g / m ²	
	生理食塩液注 【生食】 500m l	500m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 180分で		
注射	6 点滴注射		●
	カルボプラチン (AUC=6)	0m g / A	
	5 %ブドウ糖注 250m l	250m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	7 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		