

レジメン名称：D20-302 Durva(BW≦30)/CBDCA/ETP (d1-3) q3w

休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(2)	day(3)
注射	1	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」(ヘパリンロック)	1筒			
		ワンショット：1日1回				
		(不要の場合は削除)				
注射	2	点滴注射		●		
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		ライン確保及びフラッシュ用(イミフィンジ)				
注射	3	点滴注射		●		
		イミフィンジ注	20mg/kg			
		(BW≦30の場合は20mg/kg)				
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		インラインフィルター使用				
		60分以上かけて				
注射	4	点滴注射		●		
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶			
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	5	点滴注射		●		
		カルボプラチン	0mg/A			
		(AUC=5~6)				
		5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
		点滴注射：1日1回				
		60分で				
注射	6	点滴注射		●		
		エトポシド注	100mg/m ²			
		(80~100mg/m ²)				
		5%ブドウ糖注 500mL	500mL			
		点滴注射：1日1回				
		90分で				
注射	7	点滴注射		●		
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				
注射	8	点滴注射			●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
		生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
		点滴注射：1日1回				
		30分で				
注射	9	点滴注射			●	●
		エトポシド注	100mg/m ²			
		(80~100mg/m ²)				
		5%ブドウ糖注 500mL	500mL			
		点滴注射：1日1回				
		90分で				
注射	10	点滴注射			●	●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶			
		点滴注射：1日1回				
		フラッシュ用				