

レジメン名称：D22-301 DCyBorD療法（po） サイクル3-6

休薬期間：28日

| 分類 | No. | 薬剤/手技                                                                                                | 投与量                                  | day(1) | day(8)              | day(15) | day(22) |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------------|---------|---------|
| 注射 | 2   | 皮下注射                                                                                                 |                                      | ●      |                     | ●       |         |
|    |     | ダラキューロ配合皮下注<br>(1800mg/body)<br>ワンショット：1日1回<br>エンドキサン錠内服後<br>時計回りに腹部皮下組織に投与<br>3～5分で                 | 1800m g                              |        |                     |         |         |
| 注射 | 3   | 皮下注射                                                                                                 |                                      | ●      |                     | ●       |         |
|    |     | ベルケイド注<br>(1.3mg/m <sup>2</sup> )<br>生理食塩液注 20 m l<br>(1Vあたり生食1.2mLで溶解)<br>ワンショット：1日1回<br>ダラキューロ投与後  | 1.3m g /m <sup>2</sup><br><br>1.2m L |        |                     |         |         |
| 注射 | 4   | 皮下注射                                                                                                 |                                      |        | ●                   |         | ●       |
|    |     | ベルケイド注<br>(1.3mg/m <sup>2</sup> )<br>生理食塩液注 20 m l<br>(1Vあたり生食1.2mLで溶解)<br>ワンショット：1日1回<br>エンドキサン錠内服後 | 1.3m g /m <sup>2</sup><br><br>1.2m L |        |                     |         |         |
| 内服 |     | デキサメタゾン                                                                                              | 20mg/日<br>分1 食後、又は、ダラキューロ投与日は投与前     |        | day(1)(2)(15)(16)服用 |         |         |
| 内服 |     | デキサメタゾン                                                                                              | 40mg/日<br>分1-2 食後                    |        | day(8)(22)服用        |         |         |
| 内服 |     | エンドキサン<br>(最大500mg/Body)                                                                             | 300mg/m <sup>2</sup><br>分1 ダラキューロ投与前 |        | day(1)(8)(15)(22)服用 |         |         |