

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	2 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液） 100 m l （P G）	100m L	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびフラッシュ用（キトルーダ）		
注射	3 点滴注射		●
	キトルーダ注 （200mg/body）	200m g	
	生食注（生理食塩液） 100 m l （P G）	100m L	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用、単独投与 30 分で		
注射	4 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6m g	
	アロカリス注 235 m g / 10 m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	5 点滴注射		●
	ペメトレキド注 （500mg/m ² ）	500m g / m ²	
	生食注（生理食塩液） 50 m L （ソフトバッグ）	50m L	
	点滴注射：1日1回 10 分で ペメトレキド 投与後、30分の経過観察不要		
注射	6 点滴注射		●
	カルボプラチン （AUC=5）	0m g / A	
	5 %ブドウ糖注 250 m l	250m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で ペメトレキド 投与後、30分の経過観察不要		
注射	7 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用		