

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
		ペリナNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ペリナロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回			
		(不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	
		ソルデム3A注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		2時間で			
注射	3	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		2時間で			
注射	4	点滴注射		●	
		ヴィーン3G注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		90分で			
注射	5	点滴側管注		●	
		デキサート注 3.3mg/mL	16.5mg		
		ガスター注 20mg	1A		
		ボラミン注 5mg/mL	1A		
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶		
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋		
		点滴注射：1日1回			
		ソルデム3Aと同時に側管投与			
		30分で			
注射	6	点滴側管注		●	
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		30分で(PTX投与前の時間確保用)			
		点滴注射：1日1回			
注射	7	点滴側管注		●	
		バクリタキセル注	135mg/m ²		
		(135mg/m ²)			
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		インラインフィルターを使用			
		180分で			
注射	8	点滴側管注		●	
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL		
		点滴注射：1日1回			
		30分で			
注射	9	点滴側管注		●	
		シスプラチン注	60mg/m ²		
		(60mg/m ²)			
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL		
		点滴注射：1日1回			
		ソルデム1本終了後			
		60分で			
注射	10	点滴側管注		●	
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回			
		(フラッシュ用)			
注射	11	点滴注射			●
		デキサート注 3.3mg/mL	16.5mg		
		ガスター注 20mg	1A		
		ボラミン注 5mg/mL	1A		
		生食注 (生理食塩液) 100mL (PG)	100mL		
		点滴注射：1日1回			
		30分で			
注射	12	点滴注射			●
		生理食塩液PL 50mL	50mL		
		30分で(PTX投与前の時間確保用)			
		点滴注射：1日1回			
注射	13	点滴側管注			●
		バクリタキセル注	135mg/m ²		
		(135mg/m ²)			
		生理食塩液注【生食】 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		インラインフィルターを使用			
		180分で			
注射	14	点滴側管注			●
		エトポシド注	150mg/m ²		
		(150mg/m ²)			
		5%ブドウ糖注 500mL	500mL		
		点滴注射：1日1回			
		90分で			
注射	15	点滴側管注			●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶		
		点滴注射：1日1回			
		(フラッシュ用)			